A stylized tree graphic with a brown trunk and a green canopy, serving as a background for the text.

# Wildschäden erkennen und verhindern

Datum: 21.03.2026

Ort: Salle de Fêtes à Grosbous

1, rue de Bastonge

L-9154 Grosbous

# Lukas Adolf

Studium der Forstwissenschaft in  
Weihenstephan

Referendariat bei Landesforsten  
Rheinland-Pfalz

seit 2018 freiberuflicher  
Forstsachverständiger

- Diplom - Forstwirt (FH)
- Assessor des Forstdienstes
- Im Forstbüro Matt
- Forstbüro Matt

## **Kontakt:**

Töpferstr. 19, 54290 Trier  
0049 651 99 555 33

[mail@forstbuero-matt.de](mailto:mail@forstbuero-matt.de)

[www.forstbuero-matt.de](http://www.forstbuero-matt.de)



# Ablauf

Theorieteil (Uhrzeit: 10-ca. 12:00)

1. Relevante Wildarten im Wald
2. Grundsätze der Jagd in Luxemburg
3. Jagdstrategien im Wald im Überblick
4. Die wichtigsten Wildschäden
5. Möglichkeiten der Wildschadensverhütung
6. Möglichkeiten der Einflussnahmen auf die Jagd durch den Waldbesitzer

Mittagspause

Praxisteil (Uhrzeit: ab ca. 13:00)

Rundkurs mit verschiedenen Waldbildern, Wildschäden und Wildschutzmaßnahmen

# 1. Relevante Wildarten im Wald

1.1 Rehwild



1.2 Rotwild



1.4 Muffelwild



1.3 Damwild



1.5 Schwarzwild



# 1.1 Rehwild (*Capreolus capreolus*)


- **Erscheinungsbild:**  
Höhe (Widerrist): 60 – 80 cm  
Gewicht: 14 – 20 kg
- **Fortpflanzung:**  
Brunftzeit: Juli/August  
Setzzeit: Mai/Juni (1-2 Kitze)
- **Lebensweise:**  
Kulturfolger  
Wald und Feld, z.T. auch in der Nähe von Städten
- **Nahrung:**  
Pflanzenfresser (Kräuter/ Gräser/ Triebe/  
Knospen/ Wald- und Feldfrüchte)




# Rehwild



# Abschusszahlen Rehwild




# geschossen pro km<sup>2</sup>




# 1.2 Rotwild (*Cervus elaphus*)

- **Erscheinungsbild:**  
Höhe (Widerrist): 1,0 – 1,5 m  
Gewicht: bis zu 250kg
- **Fortpflanzung:**  
Brunftzeit: September/Okttober  
Setzzeit: Mai/Juni (1-2 Kälber)
- **Lebensweise:**  
Vorwiegend in Waldgebieten  
Früher vor allem halboffene Landschaften
- **Nahrung:**  
Pflanzenfresser (Kräuter/ Gräser/ Triebe/  
Knospen/ Blätter/ Wald- und Feldfrüchte)



# Rotwild




21.03.2026


Forstbüro Matt

10

# Abschusszahlen Rotwild



# geschossen pro km<sup>2</sup>



# 1.3 Damwild (Dama Dama)

- **Erscheinungsbild:**  
Höhe (Widerrist): 100cm  
Gewicht: 60-70kg
- **Fortpflanzung:**  
Brunftzeit: Oktober/November  
Setzzeit: Juni (1-2 Kälber)
- **Lebensweise:**  
Von deckungsreichen bis lichten Wäldern  
Wald und Feld, z.T. auch in der Nähe von Städten
- **Nahrung:**  
Pflanzenfresser: Gräser/ Kräuter/ Blätter/  
Früchte/ Eicheln/ Bucheckern



# Damwild



21.03.2026

Forstbüro Matt

14


# Abschusszahlen Damwild



DAMHIRSCH & MUFFLON (1945/46 - 2023/24)  
Daim & Mouflon (1945/46 - 2023/24)



# geschossen pro km<sup>2</sup>



# 1.4 Muffelwild (*Ovis ammon musimon*)

- **Erscheinungsbild:**  
Höhe (Widerrist): 100cm  
Gewicht: 40-55kg
- **Fortpflanzung:**  
Brunftzeit: Oktober/November  
Setzzeit: März/ April (1-2 Kälber)
- **Lebensweise:**  
Bevorzugen lichte Mischwälder mit steinigem, felsigem Untergrund oder trockene Heidelandschaften
- **Nahrung:**  
Pflanzenfresser: Gräser/ Kräuter/ Laub/ Knospen/  
Eicheln/ Rinde/ Sträucher



# Muffelwild




21.03.2026


Forstbüro Matt

18

# Abschusszahlen Muffelwild




# geschossen pro km<sup>2</sup>



# 1.5 Schwarzwild (*Sus scrofa*)

- **Erscheinungsbild:**  
Höhe (Widerrist): – 80 cm  
Gewicht: 45 – 80 kg
- **Fortpflanzung:**  
Rauschzeit: November-Februar  
Setzzeit: März-Mai (3-10 Frischlinge)
- **Lebensweise:**  
Kulturfolger  
Wald und Feld, z.T. auch in der Nähe von Städten
- **Nahrung:**  
Allesfresser : Gras/ Kräuter/ Knollen/  
Wurzeln/ Früchte und Samen/ Würmer/  
Insekten/ Mäuse und Gelege/ Jungtiere/  
Aas



# Schwarzwild



21.03.2026


Forstbüro Matt

22

# Abschusszahlen Schwarzwild



# geschossen pro km<sup>2</sup>



# 2. Jagd in Luxemburg

612 Jagdlose mit je einem Jagdsyndikat:

- Obligatorische Vergabe durch das Jagdsyndikat an einen der 3 Höchstbietenden (Strohmanngefahr!)
- Verpachtungsdauer 9 Jahre, noch bis Jagdjahr 2029 / 2030
- Wald- (Grund-) besitzer können sich in den Jagdsyndikaten engagieren, z.B in den Vorstand wählen lassen.
- Pachtverträge zwischen Jagdsyndikat und Pächtern.
- Grundbesitzer können auf myguichet.lu ihre Kontodaten hinterlegen, diese werden zur Auszahlung der Jagdpacht automatisch übermittelt.


Link zu den Jagdlosen auf dem Geoportal:

[https://map.geoportail.lu/theme/emwelt?lang=de&zoom=13&X=666033&Y=6408340&layers=1783&version=3&rotation=0&opacities=1&time=&bgLayer=basemap\\_2015\\_global](https://map.geoportail.lu/theme/emwelt?lang=de&zoom=13&X=666033&Y=6408340&layers=1783&version=3&rotation=0&opacities=1&time=&bgLayer=basemap_2015_global)

# 3. Jagdstrategien im Wald

	<b>Einzeljagd</b>	<b>Gesellschaftsjagd</b>
Form	Ansitz/ Pirsch	Drückjagd
Zeitraum	Ganzjährig	Oktober-Februar
Vorteile	Als Einzelperson möglich Viel Zeit zum Ansprechen	Störung für das Wild auf einen Tag konzentriert Hohe Abschusszahl pro Tag
Nachteile	Geringe Abschusszahl pro Tag	Hoher Organisationsaufwand Nicht als Einzelperson möglich Wenig Zeit zum Ansprechen

# Wildbrettvermarktung



## Argumente für den Verbrauch von Wildfleisch:

- Gesundes Fleisch ohne Medikamente und Hormone
- Freier Auslauf seit der Geburt
- Stressfreie Erlegung
- Kein Stress durch Lebendtransport etc.
- Regionales Produkt mit kurzen Wegen vom Erzeuger zum Konsumenten

# 4. Die wichtigsten Wildschäden im Wald

Wildart	Verbiss	Schäle	Fegen
Rehwild	ja	nein	ja
Rotwild	ja	ja	ja
Damwild	ja	gering	ja
Schwarzwild	ja	nein	nein
Muffelwild	ja	ja	nein



# Meldung von Wildschäden

(gemäß Kapitel 7 Jagdgesetz vom 31. Mai 2011)

- **nur** Wildschäden, die ihren Ursprung nach der Neuverpachtung der Jagdlose im Jahr 2021 haben, können beim Jagdsyndikat gemeldet werden, da die alten Syndikate aufgelöst sind .
- gemäß Art 48 Jagdgesetz sind Wildschäden zeitnah (est tenu d'en informer dans les meilleurs délais le collège des syndics) beim Jagdsyndikat zu melden. Problematisch ist der Begriff zeitnah, da er nicht definiert ist, z.B zweimal im Jahr oder Ähnliches
- Innerhalb von 15 Tagen nach dem Eingang der Schadensmeldung beim Jagdsyndikat muss nach Art 49 ein Ortstermin zwischen Jagdpächter, Jagdsyndikat und Waldbesitzer vereinbart sein (La visite des lieux doit avoir lieu endéans un délai de quinze jours à partir de la déclaration du dommage): Ziel - gütliche Einigung der Beteiligten
- **Realität:**
  - Schäden im Wald werden häufig nicht deklariert, da sie weder von Waldbesitzern noch Jägern als solche wahrgenommen und erkannt werden!
  - es gibt keine einheitliche Schadensbewertung in Luxemburg
  - schwierigere Wertermittlung des Schadens im Wald als auf dem Feld
  - emotionale Diskussionen gegen eine starke Lobby
  - Staat / Gemeinden meldeten bisher keine Schäden – kaum Statistiken, die die Schäden belegen
- **Folge:** Aufnahme eines Seminars in die Reihe des Waldführerscheins

# Folgen von Wildschäden

Schadensart	Folgen
Verbiss	<ul style="list-style-type: none"><li>• die Jungpflanze/die Forstkultur bleibt niedrig oder stirbt ab</li><li>• Adlerfarn, Brombeere etc. überwachsen evtl. die Forstpflanzen</li><li>• Durch den selektiven Verbiss wird die Artenvielfalt minimiert</li><li>• der Wald wird älter, aber ohne Schutz verjüngen sich nur wenige „verbissharte“ Baumarten (z.B. Fichte)</li><li>• bei hohen Schalenwildbeständen leidet die Krautschicht und es bleibt teilweise nur der rohe Boden</li></ul>
Schäle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rinde ist die Schutzhaut des Baumes, ohne Rinde dringen Fäulepilze in den Holzkörper und breiten sich dort über Jahrzehnte aus</li><li>• Faules Holz ist technisch und wirtschaftlich entwertet</li></ul>
Fegen	<ul style="list-style-type: none"><li>• verzögertes oder krummes Wachstum</li><li>• Wundstellen bis hin zum Absterben einzelner Bäume</li></ul>

A stylized tree with a brown trunk and a light green canopy, serving as a background for the slide.

# Folgen von Wildschäden

## Projekt BioWild


- Erarbeitung wissenschaftlich basierter Fakten in einem Verbundprojekt verschiedener Universitäten.
- Beginn 2016 (Laufzeit von 6 Jahren)
- 5 Pilotregionen mit insgesamt 26.000ha

### Aufgabenstellung:

- Anlage von der Probegatter 1/100ha und der Vergleichsfläche
- Erprobung neuer Jagdkonzepte

# Folgen von Wildschäden

## Projekt Bio Wild



- Nahrungsaufnahme hat Einfluss auf die gesamte Vegetation
- Vielfalt an Baumarten im Zaun um den Faktor 2,5 höher


# Folgen von Wildschäden

## Projekt BioWild

- Schalenwild kann durch Saatgut- und Keimlingsäsung Waldverjüngung vollkommen verhindern.
- Außerhalb des Zaunes Sämlingsdichte nur 24-45%
- Intervalljagd steigert Abschusshöhe gegenüber anderen Jagdvarianten, trotz 4- bis 5-monatigen absoluten Jagdruhezeiten.

# Folgen von Wildschäden

## Projekt BioWild



- Erst ab einer Rehestrecke von ca. 10 Rehe/100 gibt es eine Auswirkung auf die Verbisswahrscheinlichkeit.

# 5. Möglichkeiten der Wildschadensverhütung

Kategorie	Beschreibung	Bemerkung
Zaun/Gatter	Holz- oder Metallpfosten + Drahtgeflecht	Teuer, 8 bis 15€/lfm, auch im Boden verankern.
Hordengatter	Holzopfosten + Gatter aus Holzplatten	Ebenfalls teuer
Mechanischer Schutz	Verbissschutz und Gitter/ Clips etc. zum Schutz der Terminalknospe Gitter und Matten als Schälenschutz	Kosten sehr unterschiedlich. Knospenschützer müssen jährlich verschoben werden.
Chemischer Schutz	Sprüh- und streichfähiger Verbissschutz Streichfähiger Schälenschutz	Auf zugelassene Mittel achten
Abschreckende Wirkung	Schafwolle an die Knospe Krepp-/Farbband am Trieb	Geringe Kosten, lokal unterschiedlich und teilweise nur temporär erfolgreich

# Zaun/ Gatter/ Hordengatter



# Mechanischer Schutz



# Chemischer Schutz



# Abschreckende Wirkung



21.03.2026

Forstbüro Matt

39

# Grobe Kostenübersicht

Schutzmaßnahme	Kosten
Zaun aus Drahtgeflecht 1.60 / 2.00 m	15 € -20 € / 18 – 25 € pro Laufmeter
Hordengatter 1.50 m	20 – 25 € pro Laufmeter
biologisch abbaubare Wuchshüllen	5 – 7 €/Pflanze
Terminaltriebschutz	0,5 – 1,5 €/Pflanze
Chemischer Schutz	0,8 – 1€/ Pflanze mind. 3 x, oft auch 5 x!

Im Forst kalkuliert man aktuell mit 1/3 Pflanzkosten und 2/3 Schutzkosten pro ha bei Kulturen

# Fördermaßnahmen für Wildschadensverhütung


## Finanzielle Unterstützung

- 10.- €/m für einen Zaun zwischen 1,5 und 1,8 m Höhe
- 12.- €/m für einen Zaun von 2 m Höhe
- 16.- €/m für ein Hordengatter
- 80% der Kosten bei biologisch abbaubaren Einzelschutzmaßnahmen, die Installations- und Materialkosten inbegriffen, mit einem Minimum von 250.- €
- 500.- €/Kontrollgatter
- Schutzmaßnahmen nach höherer Gewalt (Windfall/Borkenkäfer) erhalten doppelten Zuschuss

Quelle: <https://environnement.public.lu/dam-assets/fr/forets/publications/Staatliche-Foerderung-Wald-2022-WEB.pdf>

# 6. Einflussnahme der Waldbesitzer auf die Jagd

- Kontaktaufnahme und Dialog mit der Jägerschaft
- Regionale Wildkommissionen (Conseil Cynégitique Régional) können Abschussplan anheben lassen wenn es zu viele Schäden gibt
- Anlage eines Weisergatters (1/100ha)



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!



# Bildquellen

## Bildquellen:

- <https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/wildschaeden/verbiss-richtig-ansprechen>
- <https://www.melbaum.com/graw/gatterbau>
- <https://www.wald-prinz.de/wildzaun-bauen-schutz-von-forstkulturen-mit-knotengeflecht-und-co/2592>
- [https://www.agrar-direct.de/schutzmanschetten-gegen-wildverbiss-fegeschutz-blau-9204f41-f47-4d41-8e7b-59669c74a6d3.html?utm\\_source=google&utm\\_medium=cpc&utm\\_campaign=PMa&utm\\_term=&gad\\_source=1&gclid=EAlaQobChMI-9bGiMv1hAMVW5CDBx2mvAdEAQYByABEgLTpFD\\_BwE#7911=66900](https://www.agrar-direct.de/schutzmanschetten-gegen-wildverbiss-fegeschutz-blau-9204f41-f47-4d41-8e7b-59669c74a6d3.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMa&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAlaQobChMI-9bGiMv1hAMVW5CDBx2mvAdEAQYByABEgLTpFD_BwE#7911=66900)
- <https://www.waidmanns-dank.de/2014/04/fegeschaden/>
- <https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/stammschaeden-ein-dauerbrenner>
- <https://www.fluegel-gmbh.de/produkte/pflanzenschutz/schaelschutz/plant-saver-schaelschutzmatte-protect-180-f04.016>
- <https://www.fluegel-gmbh.de/produkte/pflanzenschutz/verbisschutz/plant-saver-wuchshuelle-microvent-vario-wing-f03.087a?c=86387>
- [https://w.grube.de/p/trico-verbisschutzmittel/P74-288/?articleNo=74-289&em\\_src=kw&em\\_cmp=google/shopping&gad\\_source=1&gclid=EAlaQobChMI6ZPyh871hAMVn5SDBx1\\_sQPTEAQYASABEgIi2\\_D\\_BwE](https://w.grube.de/p/trico-verbisschutzmittel/P74-288/?articleNo=74-289&em_src=kw&em_cmp=google/shopping&gad_source=1&gclid=EAlaQobChMI6ZPyh871hAMVn5SDBx1_sQPTEAQYASABEgIi2_D_BwE)
- <https://landwirt-media.com/7-tipps-zum-verbisschutz/>
- <https://www.fluegel-gmbh.de/produkte/pflanzenschutz/schaelschutz/woebra-schael-und-fegeschutz-f04.006>
- <https://www.onfarming.at/inhalt/sortiment-ratgeber/ratgeber/forstwirte-jaeger/pflanzenschutz-dungung/welchen-verbisschutz-fur-den-jungwald>
- <https://nabu-seeheim.de/verbiss-schutz-im-wald/>
- <http://www.pflanzverfahren.de/produkt/verbisschutzband/>
- <https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/wildschaeden/wildverbiss-mit-weiserflaechen-beurteilen>
- <https://www.stadtwald.fuerth.de/wald-wild-erlebnispfad/rotwild>
- <https://www.br.de/kinder/hirsch-rothirsch-geweih-tiere-lexikon-100.html>
- [https://www.naturpark-schoenbuch.de/fileadmin/\\_processed\\_/0/e/csm\\_ET\\_65444\\_0a91d4551a.jpg](https://www.naturpark-schoenbuch.de/fileadmin/_processed_/0/e/csm_ET_65444_0a91d4551a.jpg)
- <https://www.jagd.it/reh/>
- <https://www.tatzmania.com/tiere/damwild/>
- <https://www.jagd-bayern.de/jagd-wild-wald/wildtierkrankheiten-seuchen-sondermonitorings/schwarzwild/>
- <https://stock.adobe.com/de/search?k=rehwild>
- <https://www.ardalpha.de/wissen/natur/tiere/wildschwein-schweinepest-verhaltensregeln-schwarzwild-bestaende-wald-tiere-100.html>
- <https://www.ardalpha.de/wissen/natur/tiere/wildschwein-schweinepest-verhaltensregeln-schwarzwild-bestaende-wald-tiere-100.html>
- <https://www.sbs.sachsen.de/damwild-28933.html>
- <https://weidwerk.at/serie/angebirsch/angebirsch-damwild-653681>
- [https://www.digitalmagazin.de/marken/pirsch/hauptheft/2022-15/jagdpraxis/028\\_wie-schlimm-steht-es-um-das-rotwild-in-deutschland](https://www.digitalmagazin.de/marken/pirsch/hauptheft/2022-15/jagdpraxis/028_wie-schlimm-steht-es-um-das-rotwild-in-deutschland)
- [https://www.digitalmagazin.de/marken/pirsch/hauptheft/2021-3/wildes-wissen/006\\_die-maer-vom-hausschaf](https://www.digitalmagazin.de/marken/pirsch/hauptheft/2021-3/wildes-wissen/006_die-maer-vom-hausschaf)
- [https://www.wildtierportal.bayern.de/wildtiere\\_bayern/084682/index.php#group\\_10\\_135-2](https://www.wildtierportal.bayern.de/wildtiere_bayern/084682/index.php#group_10_135-2)
- <https://www.sauen.de/schwarzwildjagd/wie-oft-bekommt-schwarzwild-nachwuchs/2/>
- [https://www.digitalmagazin.de/marken/pirsch/hauptheft/2021-3/wildes-wissen/006\\_die-maer-vom-hausschaf](https://www.digitalmagazin.de/marken/pirsch/hauptheft/2021-3/wildes-wissen/006_die-maer-vom-hausschaf)
- <https://www.jagd-stmk.at/wildtiere/muffelwild/>
- [363-reh.gif \(250×303\) \(lauftext.de\)](https://www.reh.gif)
- [Trittsiegel.gif \(250×303\) \(wp.com\)](https://www.trittsiegel.gif)
- <https://djz.de/jagdpraxis-tipps-fuer-die-drueckjagd-djz-112011-2269/>
- <https://soschmecktjagd.de/>

# Textquellen

- <https://environnement.public.lu/dam-assets/fr/forets/publications/Staatliche-Foerderung-Wald-2022-WEB.pdf>
- <https://www.jagdverband.de/zahlen-fakten/tiersteckbriefe/reh-capreolus-capreolus>
- <https://waidwissen.com/rehwild>
- <https://www.wildtierportal-bw.de/de/frontend/product/detail?productId=14>
- <https://www.jagdverband.de/zahlen-fakten/tiersteckbriefe/rothirsch-cervus-elaphus>
- <https://waidwissen.com/rotwild>
- <https://www.jagdfakten.at/rotwild-steckbrief-hirsch-kahlwild-hirschkalb/>
- <https://www.jagdverband.de/zahlen-fakten/tiersteckbriefe/damwild-dama-dama>
- <https://waidwissen.com/damwild>
- <https://parey-jagdausbildung.de/steckbrief-dam-und-sikawild/>
- <https://www.jagdverband.de/zahlen-fakten/tiersteckbriefe/wildschwein-sus-scrofa>
- <https://waidwissen.com/schwarzwild>
- <https://parey-jagdausbildung.de/steckbrief-schwarzwild/>